

Fresubin®

ENERGY FIBRE

GB Food for special medical purposes. Nutritionally complete tube feed, with fibre. 1.5 kcal/ml energy density with 15 % energy from protein. With fish oil. Clinically free from lactose and gluten free (for UK only: lactose and gluten free). For the dietary management of patients with or at risk of disease-related malnutrition, in particular with increased energy needs and/or fluid restrictions. **Dosage:** To be determined by a healthcare professional according to patients' needs. Recommendation for complete nutrition ≥ 1500 ml (2250 kcal)/day. **Important notes:** To be used under medical supervision. Monitor feeding rate. Suitable as sole source of nutrition. Not suitable for children < 3 years. Use with caution in children < 6 years. Not suitable for patients with galactosaemia. Ensure adequate fluid intake. (UK only: For enteral use only).

Instructions for use: Store at room temperature. Once opened, use within 24 hours. Shake well before use! Do not use if bag is damaged, swollen or content is coagulated. Do not mix with drugs. **Ingredients:**

Water, maltodextrin, vegetable oils (rapeseed oil, high-oleic sunflower oil), edible sodium caseinate (from milk), soya protein, inulin, cellulose fibre, wheat dextrin, potassium citrate, potassium chloride, fish oil, calcium carbonate, emulsifiers (E 471, soya lecithins), choline bitartrate, stabilisers (E 460, E 466), sodium chloride, magnesium oxide, vitamin C, calcium phosphate, ferrous sulphate, zinc sulphate, niacin, vitamin E, manganese chloride, pantothenic acid, thiamin, sodium fluoride, riboflavin, vitamin B₆, cupric sulphate, vitamin A, β -carotene, folic acid, chromium chloride, potassium iodide, sodium molybdate, sodium selenite, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B₁₂. **E ALIMENTO PARA**

USOS MÉDICOS ESPECIALES. Alimentación por sonda nutricionalmente completa (1.5 kcal/ml) con fibra, con aceite de pescado. Clínicamente libre de lactosa y gluten. Para el manejo dietético de pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición relacionado a enfermedad, en particular con necesidades energéticas incrementadas y/o restricciones de fluidos. **Dosis:** La dosis la determina el profesional sanitario según las necesidades del paciente. Recomendación para alimentación completa ≥ 1500 ml (2250 kcal)/día. **Aviso importante:** Utilícese bajo indicación de médico o nutricionista. Deberá monitorizarse la velocidad de administración de la nutrición. Uso adecuado como única fuente de alimentación. No apropiado para niños < 3 años. Utilizar con precaución en niños < 6 años. No apropiado para pacientes con galactosemia. Asegurar una ingesta de líquidos adecuada. **Instrucciones de uso:** almacenar a temperatura ambiente. Una vez abierto, usar en 24 horas. Conservar a temperatura ambiente no superior a los 25 °C. ¡Agitar bien antes de usar! No usar si la bolsa está deteriorada o hinchada o si el contenido está coagulado. No mezclar con medicamentos. **Ingredientes:** Agua, Maltodextrina, Aceites vegetales (colza, aceite de girasol alto oleico), Caseinato de sodio comestible (de la leche), Proteínas de soja, Inulina, Fibra celulosa, Dextrina de trigo, Citrato de potasio, Cloruro de potasio, Aceite de pescado, Carbonato de calcio, Emulgentes (lecitinas de soja, E 471), Bitartrato de colina, Estabilizadores (E 460, E 466), Cloruro de sodio, Óxido de magnesio, Vitamina C, Fosfato de calcio, Sulfato de hierro, Sulfato de zinc, Niacina, Vitamina E, Cloruro de manganeso, Ácido pantoténico, Tiamina, Fluoruro de sodio, Riboflavina, Vitamina B₆, Sulfato de cobre, Vitamina A, β -caroteno, Ácido fólico, Cloruro de cromo, Yoduro de potasio,

Molibdato de sodio, Selenito de sodio, Biotina, Vitamina K, Vitamina D, Vitamina B₁₂. **GR Τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Διατροφικά πλήρης σίτιση με καθήκον υψηλής θερμιδικής αξίας (1,5 kcal/ml) με φυτικές ίνες, με ιχθυέλαιο. Είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι δεν περιέχει λακτόζη, χωρίς γλουτένη. Για τη διατροφική αγωγή σε περίπτωση/σε κίνδυνο υποθρεψίας, ειδικά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες ή/και περιορισμένη πρόσληψη υγρών. **Δοσολογία:** Πρέπει να καθορίζεται από επαγγελματία υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Συστήνεται ως πλήρη διατροφή 1500 ml (2250kcal)/ημέρα. **Σημαντικές πληροφορίες:** Να χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη. Να παρακολουθείται το ρυθμό σίτισης. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Μην κατάλληλο για παιδιά ηλικίας < 3 ετών. Χρήση με προσοχή σε παιδιά ηλικίας < 6 ετών. Δεν προορίζεται για ασθενείς με γαλακτοσαιμία. Να διασφολίζεται επαρκή πρόσληψη υγρών. **Οδηγίες χρήσης:** Να Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το άνοιγμα, να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Ανακινώστε καλά πριν τη χρήση! Να μην χρησιμοποιείται εάν ο σάκος είναι κατεστραμμένος ή διογκωμένος ή το περιεχόμενο παρουσιάζει πήγματα. Μην αναμιγνύετε με φάρμακα. **Συστατικά:** Νερό, μαλτοδεξτρίνη, φυτικό έλαιο (κρμβέλαιο, ηλιέλαιο με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκόλαδο), βρώσιμο καζεϊνικό γάλακτο (από γάλα), πρωτεΐνη σόγιας, ινουλίνη, ίνα κνυτταρίνης, δεξτρίνη σίτου, κνικρικό κάλιο, κλωριούχο κάλιο, ιχθυέλαιο, ανθρακικό αέριο, γαλακτοματοποιήτες (E 471, λεκιθίνες σόγιας), διπρωμική χολίνη, σταθεροποιητές (E 460, E 466), κλωριούχο νάτριο, οξείδιο του μαγνησίου, βιταμίνη C, φωσφορικό ασβέστιο, θεικός σίδηρος, θεικός ψευδάργυρος, νιασίνη, βιταμίνη E, κλωριούχο μαγγάνιο, παντοθενικό οξύ, θειαμίνη, φθοριούχο νάτριο, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη B₆, θεικός χαλκός, βιταμίνη A, β -καροτένιο, φολικό οξύ, κλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, μολβδαϊνικό νάτριο, σεληνικό νάτριο, βιοτίνη, βιταμίνη K, βιταμίνη D, βιταμίνη B₁₂. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 40576/30-11-1999. **CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Nutričně kompletní vysokokalorická (1,5 kcal/ml) výživa určená k podávání sondou, s vlákninou a rybím olejem. S nízkým obsahem laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při jejím riziku, zejména při zvýšené potřebě energie a/nebo omezení příjmu tekutin. **Dávkování:** Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené dávkování při celkové výživě je ≥ 1500 ml (2250 kcal)/den. **Důležitá upozornění:** Podávat pod lékařským dohledem. Monitorujte rychlost podávání. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nepodávat dětem mladším 3 let. Užívat opatrně u dětí mladších 6 let. Nevhodné pro pacienty s galaktosemií. Zajistěte dostatečný příjem tekutin. **Návod k použití:** Uchovávejte při pokojové teplotě. Po otevření použijte do 24 hodin. Před použitím dobře protřepat! Nepoužívat, je-li vak poškozen, nafouklý nebo obsahuje-li sraženiny. Nemíchejte s léky. **Složení:** Voda, maltodextrin, rostlinné oleje (řepkový olej, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové), jedlý kaseinát sodný (z mléka), sójová bílkovina, inulin, celulóznová vláknina, **pšeničný** dextrin, citrát draselný, chlorid draselný, **rybí** olej, uhlíkatý vápenatý, emulgátory (E 471, sójové lecitiny), cholín bitartrát, stabilizátory (E 460, E 466), chlorid sodný, oxid hořečnatý, vitamín C, fosforečnan vápenatý, síran železnatý, síran zinečnatý, niacin, vitamín E, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, thiamin, fluorid sodný, riboflavin, vitamín B₆, síran měďnatý, vitamín A, β -karoten, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, molybdenan sodný, seleničtan sodný, biotin, vitamín K, vitamín D, vitamín B₁₂.

Not for parenteral (I.V.) use / ¡No administrar por vía parenteral! / Όχι για παρεντερική (ενδοφλέβια) χρήση! / Není určeno k parenterálnímu (i.v.) podání!

Fresubin® ENERGY FIBRE

Fresubin® ENERGY FIBRE

e 500 ml

FRESENIUS KABI

EasyBag

Technical Specifications

EasyBag Fresubin Energy Fibre	
Size:	500 ml
Document:	0457991_2_GB-E_Ex-GR-CZ_500ml
Colours:	2 Colours Pantone 300 C Pantone 306 C
Languages:	GB-E_Ex-GR-CZ
Number of Languages:	4
Type size:	6,5/7 pt
Page of Document:	2
Date:	16-08-2022

■ Stanzform nicht druckend!!!

Fresubin®

ENERGY FIBRE

Nutrition values/Análisis medio/ Μέση περιεκτικότητα/Nutriční hodnoty

	/100 ml		/100 ml
Energy/Energía/ Ενέργεια/Energetická hodnota kJ/kcal... 630/150	Thiamin/Tiamina/Θειαμίνη/Thiaminmg..... 0.13
Fat/Grasas/Λιπίδια/Tukyg..... 5.8	Riboflavin/Riboflavina/Ριβοφλαβίνηmg..... 0.17
of which/de las cuales/ek των οποίων/z toho		Niacin/Niacina/Νιασίνηmg (mg NE)... 1.6 (2.9)
- saturates/saturadas/κορεσμένα/ nasyčené mastné kyselinyg..... 0.5	Vitamin B ₆ /Vitamina B ₆ / Βιταμίνη Β ₆ /Vitamina B ₆mg..... 0.16
- mono-unsaturates/monoinsaturadas/ μονοκόρεστα/monoenасыčené mastné kyselinyg..... 3.9	Folic acid/Ácido fólico/ Φολικό οξύ/Kyselina listováµg..... 26.7
- polyunsaturates/polinsaturadas/ πολυκόρεστα/polynenasасыčené mastné kyselinyg..... 1.4	Vitamin B ₁₂ /Vitamina B ₁₂ / Βιταμίνη Β ₁₂ /Vitamina B ₁₂µg..... 0.27
- Eicosapentaenoic acid (EPA) + docosahexaenoic acid (DHA)/EPA + DHA	g..... 0.05	Biotin/Biotina/Biotinµg..... 5.0
Carbohydrate/Hidratos de carbono/ Υδατάνθρακες/Sacharidyg..... 18	Pantothenic acid/Ácido pantoténico/ Παντοθενικό οξύ/ Kyselina pantotenovámg..... 0.47
of which/de los cuales/ek των οποίων/z toho		Sodium/Sodio/Νάτριο/Sodíkmg/mmol... 100/4.4
- sugars/azúcares/σάκχαρα/cukryg..... 1.2	Potassium/Potasio/Κάλιο/Draslíkmg/mmol... 207/5.3
- lactose/lactosa/λακτόζη/laktózag..... ≤ 0.03	Chloride/Cloruro/Χλωριούχο ο/ Chlormg/mmol... 153/4.3
Fibre/Fibra/Φυτικές ίνες/Βιόκιναg..... 1.5	Calcium/Calcio/Ασβέστιο/Vápnikmg/mmol... 67.0/1.7
Protein/Proteínas/Πρωτεΐνες/Bilkovinyg..... 5.6	Phosphorus/Fósforo/ Φώσφορος/Fosformg/mmol... 53.0/1.7
Salt/Sal/Αλάτι/Sůlg..... 0.25	Magnesium/Magnesio/ Μαγνήσιο/Hořčíkmg/mmol... 24.0/1.0
Vitamin A/Vitamina A/Βιταμίνη Α/Vitamin Aµg RE..... 92.0	Iron/Hierro/Σίδηρο/Zelezomg..... 1.3
of which/de la cual/ek των οποίων/z toho		Zinc/Ψευδάργυρος/Zinekmg..... 1.2
- β-Carotene/β-caroteno/ β-καροτένιο/β-karotenµg RE..... 22.0	Copper/Cobre/Καλλός/Měďmg..... 0.13
Vitamin D/Vitamina D/Βιταμίνη D/ Vitamin Dµg..... 1.3	Manganese/Manganeso/ Μαγγάνιο/Manganmg..... 0.27
Vitamin E/Vitamina E/Βιταμίνη E/ Vitamin Emg α-TE..... 3.0	Fluoride/Fluoruro/Φθοριοξύ/Fluormg..... 0.13
Vitamin K/Vitamina K/Βιταμίνη K/ Vitamin Kµg..... 6.7	Selenium/Selenio/Σελήνιο/Selenµg..... 6.7
Vitamin C/Vitamina C/ Βιταμίνη Cmg..... 6.7	Chromium/Cromo/Χρόμιο/Chromµg..... 6.7
		Molybdenum/Molibdeno/ Μολυβδαίνιο/Molybdenµg..... 10
		Iodine/Ioduro/Ίωδιο/Jódµg..... 13.3
		Choline/Colina/Χολίνη/Cholinmg..... 36.7

Not for parenteral (i.v.) use / iNo administrar por vía parenteral! / Όχι για
παρεντερική (ενδοφλέβια) χρήση! / Není určeno k parenterálnímu (i.v.) podání!

300 ml

200 ml

100 ml

Osmolarity/Osmolaridad/
Οσμωμοριακότητα κ.ο./Osmolarita..... 325 mosmol/l
Water/Agua/Νερό/Voda..... 76 ml/100 ml
Fat/Grasas/Λιπίδια/Tuky..... 35 kJ%
Carbohydrate/Hidratos de carbono/
Υδατάνθρακες/Sacharidy..... 48 kJ%
Fibre/Fibra/Φυτικές ίνες/Βιόκινα..... 2 kJ%
Protein/Proteínas/Πρωτεΐνες/Bilkoviny..... 15 kJ%

Distributor/Distribuidor:/Υπεύθυνος κυκλοφορίας:

Fresenius Kabi Ltd., GB-Runcorn, WA7 1NT • Laboratorio Libra S.A., Arroyo Grande
2832, T. 1704, Montevideo, Uruguay, Aut MSP N° 76563, DT. Ma. Beatriz Viera OF.
Venta libre en condiciones reglamentarias • Libra Paraguay S.A., Paraguay,
RS: 24769-01-SD • Grupo Hospifar S.R.L., República Dominicana, RS: 48169 • Fresenius Kabi Hellas
A.E., Α. Κηφισίας 64Α, 5125 Μαρούσι Αττικής, Τηλ: 21065429099 • Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65,
140 00 Praha 4 Česká republika • Fresenius Kabi South Africa, 162 Tonetti Street, Halfway House, 1685

Manufacturer/Fabricante:/Παρασκευαστής;/Výrobce:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Hemocare Netherlands B.V.
61346 Bad Homburg/Germany 7881 HM Emmer-Compascuum/Netherlands


DE LOT 29xxx

NL LOT 28xxx

LOT :

▲ Best before end/Consumir
preferentemente antes
del fin de:/Ανάλωση κατά
προτίμηση πριν από το
τέλος/Minimální trvanlivost
do konce:

see coding on front or back/ver código al
frente o al dorso/βλέπε κωδικοποίηση στο
εμπρός ή πίσω μέρος/viz označení na
přední nebo zadní straně obalu



e 500 ml
(150 kcal/3150 kJ)

04579912 08-E(E)-GR-CZ

www.fresenius-kabi.com